



پروفنوفوس ۵۰٪ - ۴۰٪ امولسیون

Profenofos 40% - 50% EC

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۲ لیتر در هکتار از فرمولاسیون ۵۰٪	کرم غوزه	پنبه
۲/۵ لیتر در هکتار از فرمولاسیون ۴۰٪	کرم غوزه	پنبه

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

آتروپین و دیازپام و اکسیم های فعال کننده (مثل توکوزوگونین، ا بی دوکسیم).

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۴ روز است.

فرمول شیمیایی: $C_{11}H_{15}BrCl_3OPS$

وزن مولکولی: (۳۷۳/۶)

گروه: Organophosphate

ماده مؤثر: ۴۰۰ گرم بر لیتر - ۵۰۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۶۰۰ گرم بر لیتر - ۵۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 358 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

حشره کش و کنده کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع دارای اثر

Translaminar



کرم غوزه پنبه



زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinegroup.com