

پیری پروکسی فن ۱۰% امولسیون

Pyriproxyfen 10% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۵۰ تا ۷۵ میلی‌لیتر در هکتار (۰/۵ تا ۰/۷۵ در هزار)	شپشک قهوه‌ای	مرکبات
۷۵۰ میلی‌لیتر در هکتار	عسلک	پنبه

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

از کاربرد این سم در جوار درختان توت و مناطق نوغان خیز خودداری شود. این سم ترکیب هورمونی و تنظیم کننده رشد حشرات می باشد. با توجه به خط این سم برای

آزبان احتیاطات لازم صورت پذیرد.

فرمول شیمیایی: $C_{20}H_{19}NO_3$

وزن مولکولی: (۳۲۱/۵)

گروه: Juvenile hormone mimic (IGRs)

ماده مؤثر: ۱۰۰ کیلوگرم

مواد همراه: ۹۰۰ کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats > 5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

هورمونی که مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل می شود.



عسلک پنبه



شپشک قهوه ای

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com