

سایپر مترین ۴۰% امولسیون

Cypermethrin 40% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۲۵۰ میلی‌لیتر در هکتار	آفات برگ‌خوار	سیب
۱۷۵ میلی‌لیتر در هکتار (۷۵ میلی‌لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب)	آفات برگ‌خوار	پنبه

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پاد زهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۲۱ روز است.

فرمول شیمیایی: $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$

وزن مولکولی: (۴۱۶/۳)

گروه: Pyrethroid

ماده مؤثر: ۴۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۶۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:


Oral LD₅₀ for Rats 250-4150 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تاثیر:

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه سمپاشی شده.



سوسک کلرادو



کرم برگ‌خوار پنبه

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.