

فوزالن ۳۵ % امولسیون

Phosalone 35% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	برگخوار	آفتابگردان
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	آفات برگخوار	چغندر قند و سوبا
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	کرم سیب	به و آلو
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	بسیل، زنبور، سرخرطومی	گلپای و سیب
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	کرم خوشه‌خوار	انگور
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	زنجبرک	به و انگور
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	پروانه چوبخوار	پسته
۲/۵ در هزار	بسیل	
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	آفات	ذرت
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	سرخرطومی	بویجه
۱/۵ در هزار یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار	کلرادو	سیب زمینی

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد

پانزهر:

آتروپین ، 2PAM ، به مسموم بی‌هوش چیزی خورنده نشود.

مدیریت کاربرد:

این سم کولین استراز خون را کاهش می‌دهد.

فرمول شیمیایی: $C_{12}H_{15}CLNO_4PS_2$

وزن مولکولی: (۳۶۷/۸)

گروه: Organophosphates

ماده مؤثر: ۳۵ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۶۵۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 120 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تأثیر:

حشره کش و کنده‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی.



زردره مو



سرخرطومی بونجه



سوسک کلرادو

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com