



پروپارژیت ۵۷ % امولسیون

Propargite 57% EC

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱ / ۵ لیتر در هکتار	کنه تار تن (عنکبوتی)	پنبه و سویا
۱ لیتر در هکتار	کنه تار تن (عنکبوتی)	چغندر قند
۱ در هزار	کنه قرمز اروپایی	درختان میوه به استثنای گلابی و به
۱ در هزار	کنه معمولی	پسته
۲ در هزار	کنه	حبوبات
۱ در هزار	کنه دو نقطه‌ای	لوبیا
۱ در هزار	کنه دو نقطه ای	درختان جنگلی و غیر متمر
۱ / ۲ در هزار	کنه پاکوتاه قرمز	چای

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سررد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی .

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب کنه کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

موارد عدم مصرف :

روی به و گلابی مصرف نشود.

فرمول شیمیایی:  $C_{19}H_{20}O_4S$

وزن مولکولی: (۳۵۰/۵)

گروه Sulfite

ماده مؤثر: ۵۷ گرم بر کیلو گرم

مواد همراه: ۴۳ گرم بر کیلو گرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 2800 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (احتیاط)

نحوه تاثیر :

کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی که از طریق تنفس هم بر روی

کنه تاثیرگذار می باشد.



کنه دو نقطه ای



کنه پاکوتاه چای



کنه قرمز اروپایی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.