



فن پیروکسی میت ۵٪ سوسپانسیون

Fenpyroximate 5% SC

موارد مصرف :

معمول	آفات	میزان مصرف
مرکبات	کنه قرمز	۰/۵ در هزار + ۱٪ روغن امولسیون شونده (کنه بالغ و پوره)
	کنه زنگ	۰/۵ در هزار (کنه بالغ و پوره)
سیب	کنه نقره‌ای	۰/۵ - ۰/۷ در هزار
	کنه قرمز اروپایی	۰/۵ در هزار
	کنه زنگ	۰/۵ در هزار (کنه بالغ و پوره)

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب کنه کش به پزشک مراجعه گردد.

پایزهر:

این سم پایزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیوهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

برای مبارزه با تخم کنه قرمز مرکبات همراه با روغن ولک مورد استفاده قرار گیرد

(۰/۵ در هزار + ۱٪ روغن ولک)

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۴ روز می باشد.

فرمول شیمیایی: $C_{14}H_{27}N_3O_4$

وزن مولکولی (۴۲۱/۵)

گروه: Phenoxypprazol

ماده مؤثر: ۵۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۹۵۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for male Rats 480 mg/kg and for female

Rats 245 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

کنه کش با اثر تماسی و نفوذی بسیار بالا، از انتقال الکترون در میتوکندری ها مانع

می کند. با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم بکار می رود.



کنه دو نقطه ای



کنه پا کوتاه چای



کنه قرمز اروپایی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com