



هگزری تیاژوکس ۱۰٪ امولسیون

Hexythiazox 10% EC

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۵۰۰ تا ۷۵۰ میلی‌لیتر در ۱۰۰ لیتر آب با اختلاط یک لیتر روغن	کنه قرمز	مرکبات

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی، سوزش دهانی و اسهال

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب کنه کش به پزشک مراجعه گردد.

پانزهر:

این سم یادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خوراندن نشود.

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۴ روز است

فرمول شیمیایی: $C_{17}H_{21}ClN_2O_2S$

وزن مولکولی: (۳۵۲/۹)

گروه: Mite growth inhibitor

ماده مؤثر: ۱۰۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۹۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمیت حاد ندارد)

نحوه تاخیر:

هگزری تیاژوکس کنه کش غیر سیستمیک است که با خاصیت تماسی و گوارشی کنه های زیان آور درختان مرکبات را کنترل می کند. هگزری تیاژوکس با نفوذ از سطح برگ به بافت های گیاهی و با اثر تخم کشی، لارو کشی و شفیره کشی، مراحل مختلف انواع کنه ها را به نحو مؤثر کنترل می کند.



کنه قرمز مرکبات



خسارت کنه قرمز مرکبات

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.