

استوکلر ۷۶% امولسیون + ایمن کننده دی کلر آمید Acetochlor 76% EC+Dichlormid



موارد مصرف :

نام محصول	نوع علف هرز	مقدار و زمان مصرف
ذرت	علف‌های هرز یکساله به ویژه بهن برگ ها	علف کش پیش رویشی و پیش از کاشت ۲/۷۵ تا ۳/۸۰ لیتر در هکتار

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی باید اجتناب کرد.

علائم مسمومیت:

سررد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

استوکلر پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی $C_{14}H_{20}ClNO_2$

وزن مولکولی (۲۶۹/۸)

گروه: Sulfonylurea

ماده مؤثر: ۷۶۰ گرم کیلوگرم

مواد همراه: ۲۴۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats 2148 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

انتخابی، بازدارنده سنتز پروتئین و مانع تقسیم سلولی که اساسا از طریق

جوانه ها و ریشه گیاه جوانه زده جذب می شود.



تاج خروس



سلمه دره

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.