

اکسی فلورفن ۲۴ % امولسیون

Oxyfluorfen 24% EC



موارد مصرف :

مصرف	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
پیاز	علف های هرز پهن برگ و نازک برگ	۲ لیتر در هکتار در مرحله ۲ تا ۵ برگی پیاز یا در دو نوبت هر نوبت ۰/۷۵ لیتر به فاصله ۱۸ روز

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

این سم پادز هر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

برای بعضی زراعت ها مانند سویا، باغات پسته ممکن است ایجاد گیاهسوزی کند.

فرمول شیمیایی: $C_{15}H_{11}ClF_3NO_4$

وزن مولکولی (۳۶۱/۷)

گروه: Diphenylether

ماده مؤثر: ۲۴۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۷۶۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats > 5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

U (سمیت حد ندارد)

نحوه تاثیر:

علف کش تماسی انتخابی که عمدتاً از طریق برگ جذب شده و اثر می نماید.



گل پنبه



ناج خروس

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.