



ایماز تاپیر ۱۰% مایع قابل حل در آب

Imazethapyr 10% SL

موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۱-۷۵/۰ لیتر در هکتار	علفهای هرز پهن برگ	یونجه

علائم مسمومیت:

سرگرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

ایماز تاپیر پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

ایماز تاپیر فقط یکبار در سال برای سمپاشی استفاده شود و از استفاده مداوم به دلیل خطرات احتمالی که برای کشت بعدی دارد خودداری شود. در سال آخر کشت یونجه از مصرف آن خودداری گردد. اضافه نمودن سولفات آمونیوم (5Kg /ha) و با فریگیت به محلول تهیه شده برای سمپاشی خاصیت جذبی را توسط علف های هرز افزایش می دهد.

فرمول شیمیایی: $C_{15}H_{19}N_3O_3$

وزن مولکولی: (۲۸۹/۳)

گروه Imidazolinone

ماده مؤثر: ۱۰۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۹۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

ایماز تاپیر علف کشی انتخابی، سیستمیک با خاصیت ابقایی که از طریق برگ و ریشه جذب می شود.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.



ناج خروس



پرچک

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com