

کلودینافوپ پروپارژیل ۸% امولسیون

Clodinafop Propargyl 8% EC



موارد مصرف :

معمول	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
گندم	علف‌های هرز کشیده برگ یکساله (یولاف وحشی، خونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)	۱ - ۸ / لیتر در هکتار بصورت پوس رویشی (حداکثر تا پایان پنجه زنی)

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

یادزهر:

کلودینافوپ پروپارژیل پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

سمیت برای محیط زیست :

برای ماهیان خطر ناک می باشد.

مدیریت کاربرد:

از مصرف این علفکش توسط سمپاشهای دستی یا موتوری خودداری گردد. از مصرف این سم در مزارع جو خودداری شود. این سم قابلیت اختلاط با توفورچی را ندارد.

فرمول شیمیایی  $C_{17}H_{13}CLFNO_4$

وزن مولکولی (۳۴۹/۸)

گروه Aryloxyphenoxypropionate

ماده مؤثر: ۸۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۹۲۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD<sub>50</sub> for rats 1392(male), 2271(female) mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

انتخابی، سیستمیک، بازدارنده استیل کوآنزیم T-کربوکسیلاز (Accase).

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.



چچم



یولاف



دم روباهی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.