

لینورون ۴۵% سوسپانسیون، ۵۰% پودر با قابلیت ترشوندگی  
Linuron 45% SC, 50% WP



موارد مصرف :

محصول	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
هویج	علف‌های هرز (کنشیده برگ و بهن برگ)	۲/۵ لیتر در هکتار بیش رویشی
ذرت	علف‌های هرز (کنشیده برگ و بهن برگ)	۵۰% WP، ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتار بیش رویشی
سیب‌زمینی، بنبیه، سویا	علف‌های هرز (کنشیده برگ و بهن برگ)	۵۰% WP، ۲ تا ۶ کیلوگرم در هکتار بیش رویشی
نیشکر	علف‌های هرز (کنشیده برگ و بهن برگ)	۲ تا ۶ کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک
نخود دیم	علف‌های هرز (کنشیده برگ و بهن برگ)	۴۵% SC، ۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک
عدس دیم	علف‌های هرز (کنشیده برگ و بهن برگ)	۴۵% SC، ۱/۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک

#### احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

#### علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

#### کمک‌های اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

#### پادزهر:

مواد آرام بخش، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

#### مدیریت کاربرد:

این سم دارای باقیماندگی در خاک است و باید به میزان حساسیت محصول بعدی توجه نمود.

فرمول شیمیایی:  $C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$

وزن مولکولی (۲۴۹/۱)

ماده مؤثر: ۴۵۰ گرم بر لیتر، ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۵۰۰ گرم بر لیتر، ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats 1500- 4000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زبان‌آور)

نحوه تأثیر:

لینورون علف‌کشی انتخابی و سیستمیک با خاصیت ابقایی و مقداری خاصیت تماسی که مانع عمل فتوسنتز گیاه شده و قابل استفاده در خاک و بر روی شاخ و برگ گیاه می‌باشد.



سوروی



داج خروس

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف نشود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می‌باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی‌باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com