

تری سیکلازول ۷۵% پودر با قابلیت ترشوندگی
Tricyclazole 75% Wp



موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	محصول
محلول پاشی با استفاده از ۵/۰ کیلوگرم در هکتار پس از ظهور ۳۰ تا ۴۰ درصد خوسه‌ها با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش‌آگاهی	بلاست	برنج

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سررد، سرگیجه، اسهال، تهوع و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی $C_9H_7N_3S$

وزن مولکولی (۱۸۹/۲)

گروه Reductase

ماده مؤثر: ۷۵۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۲۵۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for rats 314 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زبان‌آور)

نحوه تأثیر:

قارچکش سیستمیک است.



بلاست برنج

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.